

NUESTRO ENVASE POR EXCELENCIA

Estudios de compatibilidad fármaco-envase

	Fleboflex®	
	5 °C	25 °C
Cefotaxima / 0,5 mg/ml en SF	10 días	1 día
Cefuroxima / 0,5 mg/ml en SF	10 días	1 día
Ciclofosfamida / 2 mg/ml en SF	6 días	5 días
Diazepam / 50 µg/ml en SF	10 días	4 días
Docetaxel / 0,3 mg/ml en SF	7 días	7 días
Doxorubicina / 0,1 mg/ml en SF	30 días	15 días
Etopósido / 0,3 mg/ml en SF	-	10 días
5-Fluorouracilo / 3 mg/ml en SF	28 días	28 días
Isosorbida Dinitrato / 0,1 mg/ml en SF	10 días	10 días
Metilprednisolona / 5 mg/ml en SF	10 días	2 días Prednisolona libre > 6,6
Morfina / 0,1 mg/ml en SF	10 días	10 días
Nitroglicerina / 50 µg/ml en SF	10 días	10 días
Ondansetron / 80 µg/ml en SF	10 días	10 días
Paclitaxel / 0,3 mg/ml en SF	7 días	7 días
Propofol / 2 mg/ml en GD 5%	10 días	10 días

MEJORA LA SEGURIDAD EN LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS EN LA FARMACIA HOSPITALARIA

Estudios de compatibilidad fármaco-envase

Fleboflex® Luer	
25 °C	
Bleomicina sulfato / 0,15 U/ml en SF	7 días
Carboplatino / 0,5 mg/ml en SF	7 días
Cisplatino / 0,5 mg/ml en SF	7 días
Citarabina / 13 mg/ml en SF	7 días
Dacarbazina / 3,4 mg/ml en SF	1 día*
Docetaxel / 0,3 mg/ml en SF	7 días
Etopósido / 0,3 mg/ml en SF	7 días
Epirubicina / 2 mg/ml en SF	7 días
Fludarabina / 6 mg/ml en SF	7 días
Gemcitabina / 4 mg/ml en SF	7 días
Idarubicina / 1 mg/ml en SF	7 días
Ifosfamida / 1 mg/ml en SF	7 días
Irinotecan / 2,8 mg/ml en SF	7 días
Leucovorina / 10 mg/ml en SF	7 días
Metotrexato / 1 mg/ml en SF	7 días
Mitoxantrona / 0,2 mg/ml en SF	7 días
Oxaliplatino / 0,6 mg/ml en GD 5%	7 días
Paclitaxel / 0,3 mg/ml en SF	7 días
Vinblastina / 0,2 mg/ml en SF	7 días
Vincristina / 0,04 mg/ml en SF	7 días
Vinorelbina / 1 mg/ml en SF	7 días

*Las soluciones recién preparadas (reconstituidas) y adicionalmente diluidas de Dacarbazina medac se deben proteger de la luz y se deben utilizar de inmediato.¹

1. Ficha Técnica España Dacarbazina medac 2017.